



## بلاغ صحفي

06 فبراير 2021

## وزارة الصحة تقرر الإبقاء على لقاح "سينوفارم" لدى الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ولتوسيع المعلومات المتعلقة باللقاءات المعتمدة من طرف المغرب، وبناء على المعطيات المتوفرة لدى اللجنة العلمية والتقنية المكلفة ببلورة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد "سارس كوف-2"، فقد قررت وزارة الصحة، الإبقاء على استخدام لقاح "سينوفارم" بالنسبة للفئة العمرية البالغة 60 سنة فما فوق، كما تمت التوصية بذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19".

واستنادا إلى رأي اللجنة، فإن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" الذي طورته "سينوفارم" حصل على الترخيص بالاستخدام، دون تحديد السن في 60 سنة من قبل العديد من البلدان، من بينها المغرب.

كما أن المناعة الشاملة لهذا اللقاح، خلال المراحلين الأولى والثانية من الدراسات السريرية، تعد "ممتازة" سواء بالنسبة للقاح سينوفارم بكين الذي شمل الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق أو للقاح سينوفارم ووهان، مع معدل للتحول المصلي يتراوح ما بين 97 و100 بالمائة عقب تلقي حقنتين".

من جهة أخرى، حفقت مناعة كورونافاك، معدل تحول مصلي يبلغ 99% بعد حقنتين. وهو لقاح صيني معطل يتم تصنيعه بنفس العملية مثل لقاح سينوفارم، والذي تم تقييمه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً وأكثر،

وبخصوص الدراسات السريرية للمرحلة الثالثة للقاح "سينوفارم بكين"، فقد أظهرت فعالية شاملة بنسبة 86 بالمائة وسلامة جيدة.

وكانت المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح "سينوفارم ووهان"، التي أجري جزء منها بالمغرب، شملت أشخاصاً تتراوح أعمارهم 60 سنة فما فوق؛ حيث أظهرت النتائج الأولية تحملًا جيداً لدى هذه الفئة من الساكنة.

وبالنسبة لمعطيات اليقظة الدوائية للحملة الوطنية للتلقيح، المتعلقة بالأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، فإنها لا تظهر أي زيادة في الآثار الجانبية مقارنة مع باقي الساكنة التي تم تلقيحها، حيث إنه إلى غاية اليوم، ومن ضمن 36 ألف 9 جرعات تم إعطاؤها من لقاح "سينوفارم"، لهذه الفئة العمرية، فقد تم الإبلاغ عن 8 حالات للآثار الجانبية الطفيفة، وهو ما يتوافق مع معدل إخطار نادر يبلغ 2.2 حالة لكل 10 آلاف.

ويشكل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق نسبة 20 بالمائة من إجمالي السكان بالمغرب. وتسجل هذه الفئة العمرية 16.7 بالمائة من الحالات المؤكدة بكوفيد-19، و75 بالمائة من حالات الوفيات جراء هذا المرض. كما يبلغ معدل الإماتة لديهم 7.9 بالمائة، أي 15.8 مرة مقارنة بمن هم دون 60 سنة.

